


嘔吐物処理や血液・体液汚染などの洗浄・消毒に、 「泡洗浄ハイター1000」を導入します。

9月に取扱いを開始していましたが(資材課ニュース第88号)、その使用方法についてお知らせします。
主成分が次亜塩素酸ナトリウムなので、取扱いに注意するよう周知徹底してください。

	使用目的	使用方法
1	嘔吐物処理 (ノロセット)	嘔吐物処理後、汚染された所(思われる所)に散布し5分放置後拭きとり、軽く水拭きする。*散布量は、20×20 cm四方に1プッシュが目安 *嘔吐物には、直接散布しない!(胃酸と混ざると、塩素ガス発生)
2	感染性胃腸炎アウトブレイク時のハイタッチ清掃	病院職員が担当するハイタッチ箇所を、指示されたレベルに従い、頻回に清拭する。プッシュできない箇所はペーパータオルに染み込ませてから清拭する。清拭後は、ペーパータオルで軽く水拭きする。
3	血液・体液汚染時の洗浄消毒	少量の汚染の場合、直接散布し5分放置後拭きとり、軽く水拭きする。大量の汚染の場合、血液・体液を拭きとった後、汚染部分に散布し5分放置後拭きとり、軽く水拭きする。*散布量は、1に同じ。
4	ポータブルトイレの外装消毒	使用後のポータブルトイレの外装に散布し5分放置後拭きとり、軽く水拭きする。
5	ゴム便器の洗浄消毒	① 便器内の排泄物を廃棄する、②軽く水洗い、③泡洗浄ハイターを散布後5分放置し拭きとる、④軽く水ですすぐ、⑤水分を十分拭き取り、保管する
6	ユーリパンの洗浄消毒(繰り返し同じ患者に使用している時)	① ユーリパンにたまった尿を廃棄する、②泡洗浄ハイターを散布後5分放置し拭きとる、③保管、 *1日1回は、通常の洗浄・消毒を行う

●血液洗浄率



出典; 花王プロフェッショナル・サービス会社